Tytuł: Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze – epidemiologia, klinika i profilaktyka / Prophylaxis of tick-borne encephalitis

Słowa kluczowe: kleszcze szczepienia ochronne wirusowe zapalenie mózgu
Keywords: epidemiology tick vaccination tick-borne encephalitis

Autorzy:

Ewa Bernatowska - Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IP-CZD

Małgorzata Pac - Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Streszczenie:

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) stanowi istotnyproblem epidemiologiczny w Europie i Polsce. Chorobęwywołuje wirus z rodziny Flaviviridae, przenoszonyprzez zakażone kleszcze lub niezmiernie rzadko drogąpokarmową. Zachorowania występują sezonowo, najczęściejw rejonach północno-wschodniej Polski. Objawyzakażenia początkowo przypominają grypę lub infekcjęgrypopodobną. W drugiej fazie pojawiają się objawy zestrony ośrodkowego układu nerwowego o różnym stopniuciężkości. Nie ma swoistego leczenia kleszczowegozapalenia mózgu. W okresie ostatnich lat obserwuje sięwzrost liczby zachorowań w prawie wszystkich krajachEuropy, w tym w Polsce. Doświadczenia austriackiewskazują na skuteczność szczepień ochronnych.

Abstract:

Tick-borne encephalitis (TBE) is a disease of centralnervous system caused by tick-borne virus, belongingto Flavoviridae family. During last years in majorityof European countries the increased incidence of thedisease has been observed. In Poland the greatestnumber of disease cases are reported seasonally fromeastern-north part. Following unspecific flu like symptomsof the first phase, potentially fatal neurologicalsecond phase appears. There is no specific treatmentof infection. Vaccination campaign against tick-borneencephalitis in Austria resulted with decreased incidence.