

Tytuł: Pokrzywka – swędząca udreka / Urticaria means itching torment

Słowa kluczowe: RUPATADYNA DZIECI LECZENIE POKRZYWKA ŚWIĄD

Keywords: TREATMENT CHILDREN RUPATADINE PRURITUS URTICARIA

Autorzy:

Irena Walecka - Klinika Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa

Adam J. Sybilski - <p>II Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 Klinika Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Warszawa </p>

Streszczenie:

Pokrzywka to dolegliwość dość często stwierdzana u dorosłych (25%) i dzieci (od 2,1 do 6,7%), mogąca znacznie obniżać jakość życia. Może przybierać postać ostrą lub przewlekłą (trwającą > 6 tygodni), być schorzeniem sporadycznym lub nawracającym. Pokrzywka definiowana jest jako nagłe pojawienie się bąbli, charakteryzujących się uniesieniem w centrum zmiany, otoczonym rumieniem. Bardzo często towarzyszy jej nasilony świąd, czasami pieczenie. Świąd jest odmiennym rodzajem czucia powierzchniowego, powodującym przykre i denerwujące uczucie skłaniające do drapania. Jest objawem, który determinuje jakość życia i funkcjonowanie pacjentów, a jego nasilenie prowadzi do frustracji, irytacji, czasami depresji, zakłóca codzienną aktywność i sen. Szacuje się, że 22% populacji doświadczało regularnie w swoim życiu uczucia świądu. Świąd w pokrzywce ma odmienny niż w innych dermatozach patomechanizm. Główną rolę odgrywa histamina i jej działanie poprzez receptory H1 i H4. Ta specyfika warunkuje odmienne leczenie. Decydującym krokiem w opanowaniu objawów pokrzywki, a głównie irytującego świądu, jest zastosowanie leków blokujących receptor histaminowy H1. W świądzie w pokrzywce u dzieci zaleca się podawanie standardowych dawek leków II generacji. W leczeniu nie powinno się stosować leków przeciwhistaminowych I generacji ze względu na ich wielorakie, potwierdzone działania niepożądane. Obecnie dostępny jest nowy lek – rupatadyna – który wykazał dużą skuteczność w leczeniu świądu i pokrzywki. Jest dobrze zbadanym, nowoczesnym lekiem przeciwhistaminowym II generacji o dodatkowym synergistycznym działaniu anty-PAF. W badaniach klinicznych rupatadyna była skuteczna i dobrze tolerowana przy dawkowaniu co 24 godz. Ma bardzo dobry profil bezpieczeństwa i może być stosowana w świądzie w przebiegu pokrzywki już od 2. roku życia.

Abstract:

Urticaria is a skin disorder that may be often observed in adults (25%) and children (from 2.1% to 6.7%), which could result in a significant reduction in quality of life. It may be acute or chronic (lasting more than 6 weeks), intermittent or persistent . Urticaria is defined as the sudden appearance of wheals with central swelling and surrounding erythema, which are typically pruritic, sometimes burning. Pruritus (itch) can be defined as a poorly localized, nonadapting, usually distressing and unpleasant sensation that causes an intense desire to scratch. It may determine the quality of life and functioning of patients, and causes frustrations, irritations, sometimes depression, interferes with daily activities and sleep. Pruritus is regularly reported in the general population (lifetime prevalence, 22%). The pathological mechanism of itch in urticaria is different than in other skin diseases. The main role is played by histamine and its effects through receptors H1 and H4. This pathomechanism determines the different treatment. A crucial step in controlling the symptoms of urticaria, and mostly annoying itching, is to use systemic antihistamines, such as H1-receptor antagonists. We have to use second-generation H1 antihistamines in standard doses. First-generation antihistamines should not be used due to their multiple confirmed side effects. Presently, we have a new drug – rupatadine, which showed high efficacy in pruritus and urticaria. It is well investigated, the modern second-generation antihistamine with additional, synergistic action of anti-PAF. Rupatadine is effective, and well tolerated dosing every 24 hours. It has a very good safety profile and can be used in itching in urticaria from 2 years old.