

Tytuł: Rodzinne ognisko postaci cholestatycznej wirusowego zapalenia wątroby typu A / Family outbreak of cholestatic hepatitis A

Słowa kluczowe: ENDEMICZNOŚĆ PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA WZW A

Keywords: ENDEMICITY POSTEXPOSURE PROPHYLAXIS HEPATITIS A

Autorzy:

Justyna Franczak - Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy

Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk - Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata Pawłowska - Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie:

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) występuje powszechnie na całym świecie. Wysoką endemiczność notuje się na obszarach Azji, Afryki oraz

Ameryki Południowej i Środkowej. Polska leży w strefie niskiej endemiczności WZW A. Większość osób w populacji polskiej nie jest uodporniona na WZW

A, co zwiększa ryzyko lokalnych zachorowań oraz epidemii wyrównawczych.

W artykule opisano rodzinę, w której u rodziców oraz najmłodszego dziecka rozpoznano ostre zapalenie wątroby typu A. Zachorowania u wszystkich

członków rodziny przebiegały pod postacią cholestatycznego zapalenia wątroby. Zastosowanie czynnej immunoprofilaktyki u pozostałej dwójki dzieci zapobiegło

wystąpieniu WZW A. Wydaje się zasadne propagowanie szczepień przeciwko WZW A w profilaktyce poekspozycyjnej.

Abstract:

Hepatitis A is a common disease all over the world. Higher occurrence of the virus is registered in Asia, Africa and South and Central America. Poland is classified

as the area of low HAV endemicity. The majority of population is not immune against hepatitis A virus and this increases a risk of local infections and

compensatory epidemics. There was a family presented, where in the parents and the youngest child hepatitis A with a variant of cholestatic liver disease

was recognized. The active immunoprophylaxis applied to other two children protected them from hepatitis A. Propagation of vaccinations against hepatitis

A virus seems to be justified in postexposure prophylaxis.