

Tytuł: Standard postępowania w toksoplazmozie wrodzonej / Congenital Toxoplasma gondii infection – clinical practice guidelines

Słowa kluczowe: TOKSOPLAZMOZA WRODZONA BADANIA PRENATALNE LECZENIE PRZECIWPIERWOTNIAKOWE TRANSMISJA MATCZYNO-PŁODOWA

Keywords: CONGENITAL TOXOPLASMOSIS ANTIPARASITIC THERAPY MOTHER TO CHILD TRANSMISSION PRENATAL SCREENING

Autorzy:

Anna Dobrzańska - <p>Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa</p>

Anna Niezgoda - <p>Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa</p>

Eliza Michalska - Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Justyna Czech-Kowalska - <p>Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa</p>

Streszczenie:

Toksoplazmoza wrodzona jest chorobą wywołowaną przez pierwotniaka *Toxoplasma gondii* (T. gondii). Może powodować poważne uszkodzenie płodu lub utajoną chorobę, która nieleczona ujawnia się w postaci późnych powikłań: ślepoty, zaburzeń neurologicznych czy opóźnionego rozwoju psychoruchowego. Skoordynowane działania ginekologów, lekarzy chorób zakaźnych i neonatologów/pediatrów powinny mieć na celu jak najwcześniejsze rozpoznanie zagrożenia dla płodu, leczenie ciężarnej, a następnie wczesną diagnostykę i leczenie noworodka. Artykuł przedstawia aktualną wiedzę na temat wrodzonego zarażenia T. gondii oraz praktyczne wskazówki dotyczące diagnostyki i leczenia tej groźnej choroby w warunkach polskich.

Abstract:

Congenital toxoplasmosis is a parasitic disease caused by *Toxoplasma gondii* (T. gondii). It may lead to a severe fetal harm or a latent disease, which when untreated may manifest as late complications: blindness, neurological disorders or delayed motor development. Coordinated efforts of gynaecologists, infectious diseases specialists and neonatologists/paediatricians should aim to early detection of fetal risk, prenatal treatment, then early diagnosis and treatment of a newborn. The article presents the current knowledge about congenital T. gondii infection and practical guidelines regarding diagnosis and treatment of this serious disease in the context of Poland.

