

Tytuł: Histiocytoza – co w badaniu podmiotowym i przedmiotowym powinno wzbudzić podejrzenia pediatry w poradni / What should raise a suspicion of Histiocytosis in pediatric out-patients clinic

Słowa kluczowe: HISTIOCYTOZA WYSYPKA ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY

Keywords: HISTIOCYTOSIS RASH SEBORRHEIC DERMATITIS

Autorzy:

Andrzej Kościeszka - Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Piotr Buda - <p>Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>

Magdalena Świtkowska - Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Anna Szadkowska - Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

Bożenna Dembowska-Bagińska - <p>Klinika Onkologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa</p>

Streszczenie:

W artykule przedstawiono opis przypadku chłopca, u którego niepoddające się leczeniu zmiany skórne początkowo sugerowały rozpoznanie łojotokowego zapalenia skóry z nadkażeniem bakteryjnym. Na podstawie charakterystycznego wywiadu lekarskiego oraz badań dodatkowych ostatecznie rozpoznano histiocytozę z komórek Langerhansa (ang. Langerhans cell histiocytosis, LCH). Omówiono heterogenną manifestację kliniczną choroby oraz podkreślono konieczność uwzględnienia histiocytozy w diagnostyce różnicowej najczęstszych zmian skórnych u dzieci.

Abstract:

The article describes the case of a boy with refractory rash, suggestive of seborrheic dermatitis complicated by bacterial infection. Based on characteristic medical history and additional studies the patient was finally diagnosed with Langerhans cell histiocytosis (LCH). The heterogeneous clinical manifestation of the disease was discussed, the need to include histiocytosis in the differential diagnosis of the most common skin changes in children was emphasized.