

Tytuł: Pieluszkowe zapalenie skóry / Diaper dermatitis

Słowa kluczowe: DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA POSTĘPOWANIE PIELUSZKOWE ZAPALENIE SKÓRY

Keywords: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS MANAGEMENT DIAPER DERMATITIS

Autorzy:

Grażyna Chodorowska - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Joanna Bartosińska - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Anna Michalak - Stoma - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie:

Pieluszkowe zapalenie skóry jest jedną z najczęściej występujących chorób okresu niemowlęcego. Wilgoć, wzrost temperatury pod pieluszką oraz maceracja obrębie warstwy rogowej zwiększają wrażliwość/podatność skóry na otarcia oraz drażniące działanie moczu, stolca oraz środków chemicznych. Zarówno w zapobieganiu jak i postępowaniu terapeutycznym najważniejsze są częste zmiany pieluszek oraz stosowanie w okolicy pieluszkowej grubej warstwy kremów ochronnych. Jakkolwiek w diagnostyce różnicowej pieluszkowego zapalenia skóry należy uwzględnić wiele chorób zajmujących okolicę pieluszkową takich, jak łuszczyca, acrodermatitis enteropathica, łojotokowe zapalenie skóry i inne.

Abstract:

Diaper dermatitis is one of the most prevalent cutaneous diseases in infants. Humidity, increased local temperature under the diaper as well as maceration of the stratum corneum increase the susceptibility of the skin to friction and irritation from the contact with urine, faeces and chemicals. Frequent diaper changes and application of thick barrier creams are helpful in both the prophylaxis and treatment. However, while making a differential diagnosis, many diseases affecting the diaper area should also be considered, including psoriasis, acrodermatitis enteropathica, seborrhoeic dermatitis and others.