

Tytuł: Zapobieganie inwazyjnym i nieinwazyjnym zakażeniom pneumokokowym u noworodków przedwcześnie urodzonych / Protection against invasive and non-invasive pneumococcal infection in preterm infants.

Słowa kluczowe: SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM PROGRAM SZCZEPIEŃ
OCHRONNYCH GRUPY RYZYKA

Keywords: RISK GROUPS IMMUNIZATION PROGRAMME PNEUMOCOCCAL VACCINATION

Autorzy:

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka - <p>Warszawski Uniwersytet Medyczny (emeryt)</p>
<p>Fundacja Bank Mleka Kobiecego, Warszawa</p>

Streszczenie:

<p>Noworodki przedwcześnie urodzone oraz z małą urodzeniową masą ciała to grupa najwyższego ryzyka narażenia na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) oraz na zakażenia nieinwazyjne, w tym na zapalenia płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae. Szczegôlnie dotyczy to noworodkôw urodzonych przed 32 tygodniem życia wewnątrzmacicznego. Przyczyną zakażeń jest zbyt niskie stéżenie swoistych przeciwciał przeciwko polisacharydom bakterii Streptococcus pneumoniae pochodzenia matczynego oraz niedojrzałość układu odporności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w oparciu o badania epidemiologiczne oraz ocené skutkôw związanych z zakażeniem nadała szczepieniom przeciwko pneumokokom najwyższy priorytet w&oscar;rd chorôb zakaźnych, ktôrym można zapobiec poprzez szczepienia 1. IChP, obok malarii, stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkości. WHO zaleca wszystkim krajom wprowadzenie powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom, kierując się aktualną sytuacją epidemiologiczną w danym kraju 2-4. Program Szczepień Ochronnych, poczyn&oscar;wszy od 2008 roku, zapewnia finansowanie szczepień obowiązkowych przeciwko pneumokokom noworodkom z masé ciała poniéj 1 500 g, a od roku 2010 rôwnieé wcześniakom poniéj 2 500 g oraz urodzonym przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży.</p>

Abstract:

<p>Infants born prematurely and with low birth weight form a group of the highest risk to develop invasive pneumococcal disease (IPD) as well as non-invasive infection, including pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae. It particularly relates to infants born before 32 weeks of age. The infection results from very low levels of maternal origin specific antibodies against polysaccharides of Streptococcus pneumoniae and the immature immune system. The World Health Organization (WHO) based on epidemiological data and evaluation of the impact of pneumococcal infections gave the immunization against pneumococcus the highest priority among the infectious diseases that can be prevented by vaccination 1. IPD, next to malaria, is the most serious threat to life and health of mankind. WHO recommends all countries to introduce universal vaccination against pneumococcus, following the current epidemiological

situation in the country 2-4. Immunization Program since 2008 provides funding of compulsory vaccination against pneumococcal infants with birth weight below 1 500g, from 2010 for those with birth weight below 2 500 g and before of 37 week of gestation.</p>