

Tytuł: Ból brzucha u dzieci i młodzieży / Abdominal pain in children and adolescents

Słowa kluczowe: CZYNNOŚCIOWY BÓL BRZUCHA ORGANICZNY BÓL BRZUCHA BÓL BRZUCHA

Keywords: FUNCTIONAL ABDOMINAL PAIN ORGANIC ABDOMINAL PAIN ABDOMINAL PAIN

Autorzy:

Carlos Lifschitz - <p>Oddział Gastroenterologii Pediatricznej, Szpital Italiano, Buenos Aires, Argentyna</p>

Streszczenie:

Przewlekły ból brzucha jest definiowany jako ból, który pojawia się okresowo lub utrzymuje się cały czas od co najmniej dwóch miesięcy. Występuje u 10 do 18% dzieci. W zależności od częstotliwości pojawiania się, ból brzucha można podzielić na przewlekły (stały) lub nawracający (epizodyczny), a ze względu na etiologię - na czynnościowy lub organiczny. Wstępna ocena pacjenta z przewlekłym bólem brzucha obejmuje przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, wykonanie badania fizykalnego (ze szczególnym uwzględnieniem oceny przyrostu masy ciała i wzrostu oraz rozwoju, badanie jamy brzusznej, miednicy, odbytu i okolicy okołoodbytniczej) oraz pobranie próbki kału do badania na krew utajoną. Celem takiego postępowania jest wykrycie alarmujących objawów, których obecność stanowi wskazanie do wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych. Długoterminowe rokowanie jest dobre.

Abstract:

Chronic abdominal pain is defined as that which occurs intermittently or constantly and has been present for at least two months. It occurs in 10 to 18% of children. According to its periodicity, pain can be divided into chronic (constant) or recurrent (episodic). According to its etiology, it can be functional or organic. Initial evaluation of the patient with chronic abdominal pain involves taking of a detailed history, a physical examination (with emphasis on growth and development, the abdomen, pelvic, perianal and rectal regions), and sampling of a stool for occult blood. The purpose is to identify any alarm signs which, if present, should lead to additional laboratory studies. The long term prognosis is good.