

Tytuł: Stosowanie probiotyków w zapobieganiu biegunce związanej z antybiotykoterapią – rekomendacje ESPGHAN / ESPGHAN recommendations on the use of probiotics for the prevention of antibiotic-associated diarrhea

Słowa kluczowe: BIEGUNKA ZWIĄZANA Z ANTYBIOTYKOTERAPIĄ PROBIOTYKI

Keywords: ANTIBIOTIC-ASSOCIATED DIARRHEA PROBIOTICS

Autorzy:

Jędrzej Sarnecki

Streszczenie:

W artykule omówiono zalecenia Grupy Roboczej ds. Probiotyków i Prebiotyków ESPGHAN dotyczące stosowania probiotyków w celu zapobiegania biegunce związanej z antybiotykoterapią. Na podstawie zebranych danych Grupa Robocza zaleca, by przy rozważaniu podawania probiotyków w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią podawać *Lactobacillus rhamnosus* GG lub *Saccharomyces boulardii*, natomiast w celu zapobiegania zakażeniu *Clostridium difficile* sugerowane jest stosowanie *Saccharomyces boulardii*.

Abstract:

The article presents the current recommendations of the Working Group on Probiotics and Prebiotics of the ESPGHAN concerning the use of probiotics for the prevention of antibiotic-associated diarrhea (AAD). Based on the available data, when the use of probiotics for the prevention of AAD is considered, the Working Group recommends using *Lactobacillus rhamnosus* GG or *Saccharomyces boulardii*. When the use of probiotics for the prevention of *Clostridium difficile*-associated diarrhea is considered, the Working Group suggests using *Saccharomyces boulardii*.