

Tytuł: Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby (FNH) jako problem diagnostyczno-terapeutyczny /
Focal liver nodular hyperplasia (FNH) as a diagnostic and therapeutic issue

Słowa kluczowe: TECHNIKI OBRAZUJĄCE DIAGNOSTYKA OGNISKOWEGO ROZROSTU
GUZKOWEGO WĄTROBY CHOROBY WĄTROBY BIOPSJA WĄTROBY OGNISKOWY ROZROST
GUZKOWY WĄTROBY

Keywords: DIAGNOSIS OF FOCAL NODULAR HYPERPLASIA IMAGING TECHNIQUES LIVER BIOPSY
LIVER DISEASES FOCAL NODULAR HYPERPLASIA

Autorzy:

Anna Liberek - 1) COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha w Gdańsku 2)
Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział
Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdańsk

Magdalena Świtlicka-Zalewska - Oddział Pediatryczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w
Gdańsku

Anna Kowalczyk - Oddział Pediatryczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Magdalena Bona - Oddział Pediatryczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Anna Kałużyńska - Oddział Pediatryczny, COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w Gdańsku

Wojciech Grabosz - Oddział Pediatryczny Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, Copernicus PL; Zakład
Pielęgniarstwa Ogólnego, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Streszczenie:

Ogniskowy rozrost guzkowy wątroby (ang. focal nodular hyperplasia, FNH) ze względu na
bezoobjawowy przebieg jest zazwyczaj wykrywany przypadkowo. Po ustaleniu rozpoznania
najczęściej zaleca się okresową kontrolę radiologiczną. Podejmując decyzję o leczeniu
chirurgicznym, zawsze należy rozważyć korzyści i ryzyko powikłań związanych z lokalizacją
zmiany.

Abstract:

Focal liver nodular hyperplasia (FNH – focal nodular hyperplasia), due to its asymptomatic
course, is usually a randomly detected lesion. Once the diagnosis is made, periodic radiological
check-ups are usually recommended for further management. When deciding on surgical
treatment, the benefits and risks of complications associated with the localization of the lesion
should always be considered.

