

Tytuł: Wskazania do wycięcia migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych u dzieci /
Indications for adenoidectomy and tonsillectomy in children

Słowa kluczowe: TONSILLEKTOMIA WSKAZANIA ZESPÓŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA PODCZAS SNU
ADENOIDEKTOMIA

Keywords: INDICATIONS SLEEP DISORDERED BREATHING TONSILLECTOMY ADENOIDECTOMY

Autorzy:

lek. med. Teresa Bis-Oleniacz - <p>Oddział Otolaryngologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa</p> <p> </p>

Tomasz Grochowski - <p>Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa</p>

Streszczenie:

Adenoidektomia i tonsillektomia lub tonsillotomia są operacjami często wykonywanymi w oddziałach laryngologii dziecięcej. Jak każdy zabieg operacyjny, operacje migdałków niosą ze sobą ryzyko powikłań. Właściwa kwalifikacja dzieci do powyższych zabiegów stanowi istotny element bezpieczeństwa małych pacjentów. We wskazaniach uwzględnia się zaburzenia oddychania w czasie snu, zaburzenia połykania i mowy, wady zgryzu i nieprawidłowy rozwój twarzoczaszki, nawracające zapalenie migdałków podniebiennych, zespół gorączek nawrotowych PFAPA, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z wysiękiem oraz przewlekłe zapalenie zatok przynosowych.

Abstract:

Adenoidectomy and tonsillectomy or tonsillotomy are the most frequent surgical procedures performed in pediatric ENT wards. Complications can occur during any other surgical treatment and therefore identification of proper indications for these procedures is an important safety measure. Indications for these procedures are sleep disordered breathing, speech and swallowing disturbances, malocclusion and abnormal craniofacial development, PFAPA syndrome, chronic otitis media with effusion and chronic sinusitis